Halaven®
(eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

10
APROBADO
POR 10 AÑOS

Su guía para HALAVEN® (mesilato de eribulina) inyectable

HALAVEN es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que ya han recibido otros tipos de medicamentos contra el cáncer después de que el cáncer se ha diseminado.

HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a algunas mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 quimioterapias previas para el cáncer de mama metastásico (metastatic breast cancer, mBC) en un estudio que incluyó a mujeres con todos los tipos de receptores tumorales

En un estudio clínico de más de 750 mujeres, HALAVEN se comparó con otras quimioterapias o terapias hormonales que se utilizan comúnmente para tratar el mBC. Si bien algunas mujeres vivieron más tiempo y otras no vivieron tanto tiempo, las mujeres que fueron tratadas con HALAVEN **vivieron, en promedio, un 25 % más** que aquellas que recibieron un tratamiento diferente (13.2 meses frente a 10.6 meses, respectivamente).

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Lo que debe saber sobre el cáncer de mama metastásico (mBC)

El mBC, también conocido como "cáncer de mama avanzado", es cáncer que se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas se desprenden de la mama y se desplazan través del sistema linfático o los vasos sanguíneos a otro lugar (por lo general, los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro). El mBC representa alrededor del 6 % de los casos nuevos de cáncer de mama y afecta a alrededor de un tercio de todas las mujeres con cáncer de mama.

EL CÁNCER DE MAMA ES UNO DE LOS TIPOS DE CÁNCER MÁS FRECUENTES EN ESTADOS UNIDOS

De estos nuevos casos, alrededor del

6 %

son metastásicos en el momento del diagnóstico

hasta el

30 %

podrían acabar convirtiéndose en metastásicos

Aunque haya recibido tratamiento con 2 quimioterapias previas para el mBC y el cáncer de mama se haya diseminado a otras partes del cuerpo, existen opciones de tratamiento disponibles.

¿Cómo funciona HALAVEN®?

Basado en los primeros estudios de laboratorio, HALAVEN funciona

1 **uniéndose al tumor**

2 **bloqueando la división celular**

3 **causando muerte celular**

Las células tumorales abandonadas pueden tener menos probabilidades de propagarse.

Para ver a HALAVEN en acción, visite www.halaven.com/metastatic-breast-cancer/what-is-halaven.

Este manual no debe reemplazar una conversación con su médico o su equipo de atención médica.

¿Qué es HALAVEN?

HALAVEN es una quimioterapia aprobada por la FDA que se ha recetado a más de 230,000 pacientes de todo el mundo, en más de 70 países*, con más de 65,000 pacientes a los que se ha recetado HALAVEN solo en EE. UU.†, que ofrecen a las mujeres con mBC avanzado la oportunidad de vivir más tiempo después de progresar con otros 2 terapia.‡

* Las indicaciones pueden variar en otros países.

† Tratamiento del paciente basado en el cálculo del uso promedio del paciente proporcionado por IntrinsiQ intelliVIEW™. Cantidad total de viales desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2020.

‡ Las terapias previas deben haber incluido una antraciclina y un taxano para el cáncer de mama inicial o avanzado.

HALAVEN se desarrolla a partir de una sustancia natural presente en la esponja marina y es el único medicamento descubierto en su clase de quimioterapia.

¿Qué información de seguridad debo conocer acerca de HALAVEN?

HALAVEN puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia).** Esto puede dar lugar a infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención médica controlará su hemograma. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta fiebre (temperatura superior a 100.5 °F), escalofríos, tos, o ardor o dolor al orinar, ya que cualquiera de estos pueden ser síntomas de infección.
- **Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos o los pies (neuropatía periférica).** La neuropatía periférica es frecuente con HALAVEN y a veces puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si tiene síntomas de neuropatía periférica nuevos o que empeoran.
- Su proveedor de atención médica puede retrasar o reducir su dosis, o interrumpir el tratamiento con HALAVEN si usted presenta efectos secundarios.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

¿Qué tan eficaz es HALAVEN®?

HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a algunas mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 quimioterapias previas para tratar el mBC en un estudio que incluyó a mujeres con todos los tipos de receptores tumorales.

ENSAYO CLÍNICO
762 mujeres

HALAVEN se comparó con otras quimioterapias o terapias hormonales que se utilizan comúnmente para tratar el mBC.

En este estudio, 8 de cada 10 mujeres tenían cáncer de mama que se había diseminado a otros sitios, incluidos los pulmones o el hígado.



Las mujeres que recibieron HALAVEN vivieron, en promedio, un 25 % más que las mujeres que recibieron otra quimioterapia o terapia hormonal (13.2 meses en comparación con 10.6 meses, respectivamente).

HALAVEN se estudió en mujeres con todos los tipos de receptores tumorales. Estos receptores pueden ser positivos o negativos.

- ER +/–
- HER2/*neu* +/–
- PR +/–
- Triple negativo

ER = receptor de estrógeno; PR = receptor de progesterona; HER2/*neu* = receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

¿Qué otra información de seguridad debo conocer acerca de HALAVEN?

Antes de recibir HALAVEN, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, por ejemplo si usted:

- tiene problemas hepáticos o renales;
- tiene problemas cardíacos, incluido un problema denominado síndrome de prolongación congénita del intervalo QT;
- tiene niveles bajos de potasio o magnesio en la sangre;
- está embarazada o planea quedar embarazada. HALAVEN puede dañar a su bebé en gestación. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa que está embarazada durante el tratamiento con HALAVEN. Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con HALAVEN y durante, al menos, 2 semanas después de la dosis final de HALAVEN y los hombres deben usar un método anticonceptivo eficaz al momento de tener relaciones sexuales con parejas mujeres que puedan quedar embarazadas durante el tratamiento con HALAVEN y por 3½ meses (14 semanas) después de la dosis final de HALAVEN;
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si HALAVEN pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con HALAVEN y por 2 semanas después de la dosis final de HALAVEN.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que usa, entre ellos, medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HALAVEN?

HALAVEN puede causar cambios en sus latidos cardíacos (lo que se denomina prolongación del intervalo QT).
Esto puede provocar latidos cardíacos irregulares. Su proveedor de atención puede hacerle un monitoreo cardíaco (electrocardiograma o ECG) o análisis de sangre durante su tratamiento con HALAVEN para detectar problemas cardíacos.

Los efectos secundarios más frecuentes de HALAVEN

- recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia)
- recuento bajo de glóbulos rojos (anemia)
- debilidad/cansancio
- caída del cabello (alopecia)
- náuseas
- estreñimiento

Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes del tratamiento y durante el tratamiento mientras esté recibiendo HALAVEN.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de fármacos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

FDA=La Administración de Alimentos y Medicamentos

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

¿Cómo se administra HALAVEN®?

Antes de recibir cada dosis de HALAVEN, su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre para controlar su hemograma y examinar la presencia de entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies.

Una infusión rápida de 2 a 5 minutos

Cada dosis de HALAVEN se administra mediante inyección durante un **período breve de 2 a 5 minutos** en forma de infusión. HALAVEN se administra una vez por semana durante 2 semanas, seguido de 1 semana de descanso. Esto se considera **1 ciclo de tratamiento**. Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de ciclos de tratamiento que usted recibirá.

Cronograma de administración de dosis recomendado para HALAVEN

Para obtener más información sobre HALAVEN, consulte la información de prescripción completa.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

¿Qué sucede si tengo efectos secundarios?

Su equipo de atención médica trabajará con usted para ayudarlo a recibir todas sus dosis programadas de HALAVEN y puede ayudar a ajustar su tratamiento, si es necesario retrasarlo por cualquier motivo.

- A veces, según su afección médica o los resultados de sus análisis de sangre o debido a sus efectos secundarios, **una disminución de la dosis o un cambio en el cronograma** puede ayudarlos a usted y a su equipo de atención médica a manejar ciertos efectos secundarios.
- Existen medicamentos que también pueden ayudarlo a tratar ciertos efectos secundarios.
  - Por ejemplo, los estimuladores de glóbulos blancos pueden ayudar al cuerpo a producir más glóbulos blancos.
- En algunos casos, los efectos secundarios no mejoran después de reducir o retrasar la dosis de HALAVEN; por lo tanto, es posible que deba dejar de usar HALAVEN.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes que pueden producirse con HALAVEN®

Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia)

Uno de los efectos secundarios de HALAVEN es la disminución de los glóbulos blancos o neutropenia. Su proveedor de atención médica debe hacerle un análisis de sangre para monitorear sus células sanguíneas antes de recibir cada dosis.

Consejos para tratar la neutropenia

- Practicar una buena higiene de manos
- Mantener un buen cuidado bucal y considerar un enjuague bucal con bicarbonato o sal y bicarbonato
- Mantener los cortes o arañazos limpios y cubiertos
- Evitar fuentes de posibles infecciones bacterianas (p. ej., bañeras de hidromasaje y ríos) y comer lácteos sin pasteurizar o carne poco cocida
- Evitar tener contacto con personas enfermas o tocar desechos humanos o animales

Caída del cabello (alopecia)

La caída del cabello es una inquietud frecuente de las personas con mBC durante el tratamiento. Es importante que sepa que no tiene que atravesar todo esto solo. Puede ser útil hablar con otras personas que hayan tenido una experiencia similar; por ejemplo, poniéndose en contacto con grupos de apoyo en la comunidad con mBC.

Consejos para tratar la alopecia

- Para prevenir o reducir la pérdida/debilitamiento del cabello, evite los productos agresivos para el cabello o el cuero cabelludo. Intente utilizar champú suave y cepillos suaves
- Evite usar elementos que puedan dañar su pelo (colorantes, sprays o bandas y presillas para el cabello)
- Reduzca la frecuencia de lavado del cabello
- Considere cambiar su peinado antes de una posible caída del cabello

Es importante que sepa que no tiene que atravesar esta pérdida del cabello sola. Puede ser útil hablar con otras personas que hayan tenido una experiencia similar; por ejemplo, poniéndose en contacto con grupos de apoyo en la comunidad con mBC.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos o los pies (neuropatía periférica)

Los problemas nerviosos, o neuropatía periférica, son otro efecto secundario de HALAVEN. Asegúrese de informar a su equipo de atención médica si siente entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies. Su médico puede recomendar la disminución de la dosis de HALAVEN para ayudar a controlar este problema.

Consejos para tratar la neuropatía periférica

- Evite los baños calientes y beber alcohol, que podrían empeorar estos síntomas
- Evite las temperaturas frías. Use guantes y calcetines
- Practique actividades de baja intensidad como ha analizado con su proveedor de atención médica (p. ej., yoga, caminar)
- Tenga cuidado al manipular objetos afilados
- Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre, ya que un nivel alto de azúcar en sangre puede dañar los nervios

Si tiene algún problema nervioso, es importante comentarlo con su proveedor de atención médica **antes de iniciar el tratamiento** con HALAVEN para establecer un valor inicial.

Sensación de mucho cansancio (fatiga)

La fatiga es frecuente entre las personas con cáncer. Puede ser de moderada a grave y, aunque puede ser manejable, no hay una cura perfecta para tratarla.

Consejos para controlar la fatiga

- Intente mantenerse activa haciendo ejercicios regularmente (con la aprobación de su proveedor de atención médica)
- Beba mucha agua, según lo que tolere (a menos que su médico le indique lo contrario)
- Coma de manera saludable para tener más energía
- Planifique el tiempo de descanso en su horario diario y pida ayuda con tareas cotidianas difíciles
- Considere obtener asesoramiento sobre salud mental, control del estrés y ejercicios de relajación para mejorar los sentimientos relacionados con la fatiga

Náuseas y vómitos

Las náuseas y los vómitos son 2 efectos secundarios frecuentes que puede experimentar. Puede tomar medidas para reducir estos síntomas por su cuenta o hablar con su equipo de atención médica sobre los medicamentos contra las náuseas que pueden ayudar a controlar estos síntomas.

Consejos para tratar las náuseas y los vómitos

- Limite el tamaño de la porción y coma varias comidas pequeñas en lugar de 3 comidas grandes.
  Elija alimentos y bebidas fáciles de digerir:
  - Aumente la ingesta de frutas y verduras
  - Limite los productos ricos en grasas (mayonesa, mantequilla)
- Evite los alimentos fritos y picantes
- Tome agua a temperatura ambiente todo el día, a menos que su médico le indique que limite la ingesta de líquidos
- Tome refresco de jengibre o té de jengibre

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes que pueden producirse con HALAVEN® (continuación)

Haga un seguimiento de sus efectos secundarios

- Hora de aparición
- Frecuencia
- Gravedad

Esta información puede ayudar a que su equipo de atención médica le ayude. Su médico puede reducir o retrasar su dosis de HALAVEN. Si los efectos secundarios no mejoran, es posible que tenga que dejar de tomar HALAVEN.

Hable con su proveedor de atención médica si experimenta alguno de estos efectos secundarios o síntomas **antes de empezar a tomar HALAVEN o mientras toma HALAVEN**. Siempre informe a su equipo de atención médica acerca de cualquier efecto secundario que esté experimentando.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Controlar el estrés de vivir con mBC

Padecer cáncer puede desencadenar muchas emociones, como conmoción, desconfianza y temor. Estas emociones son normales. Si se siente estresada o ansiosa, **hable con su equipo de atención médica**. Hay medicamentos que pueden ayudar. **Los grupos de apoyo y orientación también pueden ser útiles.**

¿Siente ansiedad por los estudios de diagnóstico? Muchas personas comienzan a sentirse ansiosas antes de someterse a un estudio de diagnóstico por imágenes o una prueba. Esta sensación es completamente normal. Si estas emociones se vuelven abrumadoras, hable con su equipo de atención médica sobre qué podría ayudarlo.

Nutrición

Es posible que las personas con cáncer deban seguir dietas que las obliguen a comer lo suficiente como para mantener las fuerzas para lidiar con los efectos secundarios del tratamiento.

Durante el tratamiento, puede haber días en los que no tenga tanto apetito como en otras épocas. Estos son algunos consejos para ayudarlo a aprovechar al máximo sus comidas y bebidas:

- Consuma la mayor cantidad de **proteínas y calorías** que pueda. Esto le ayudará a mantener las fuerzas y curar el cuerpo después del tratamiento del cáncer.
- Consuma **porciones más pequeñas o refrigerios** con más frecuencia a lo largo del día.
- Elija alimentos que **disfrute**, con alto contenido calórico y fáciles de tragar
- **No se desanime** si no tiene apetito algunos días. Informe a su médico si no puede comer durante más de 2 días.
- **Manténgase hidratada** durante todo el día

Preste atención a su nutrición y asegúrese de comer de manera saludable. Consulte a su equipo de atención médica acerca de los tipos de nutrición más adecuados para usted.

Dónde encontrar recursos útiles para el mBC

THE AMERICAN CANCER SOCIETY® | **www.cancer.org**
La Sociedad Americana contra el Cáncer lidera la lucha por un mundo sin cáncer.

BREASTCANCER.ORG | **www.breastcancer.org**
Foro de debate: http://community.breastcancer.org
Breastcancer.org ofrece información confiable, completa y actualizada sobre el cáncer de mama y la salud mamaria, y ayuda a las mujeres y sus seres queridos a tomar las mejores decisiones para sus vidas.

CANCER*CARE*® | **www.cancercare.org**
Fundada en 1944, Cancer *Care* es la principal organización nacional que ofrece servicios de apoyo de profesionales e información gratuitos para ayudar a las personas a manejar los desafíos emocionales, prácticos y económicos del cáncer. Sus servicios integrales incluyen grupos de apoyo y orientación por teléfono, en línea y en persona, talleres educativos, publicaciones y asistencia económica y para copagos. Todos los servicios de CancerCare son proporcionados por trabajadores sociales oncológicos y expertos en cáncer reconocidos en todo el mundo.

CANCER HOPE NETWORK | **www.cancerhopenetwork.org**
Cancer Hope Network proporciona apoyo emocional a pacientes con cáncer, sus seres queridos y familiares, al ponerlos en contacto con sobrevivientes del cáncer voluntarios y capacitados.

CANCER SUPPORT COMMUNITY | **www.cancersupportcommunity.org**
Como la mayor red mundial de apoyo contra el cáncer liderada por profesionales, Cancer Support Community ofrece servicios gratuitos, que ascienden a los $50 millones, a pacientes y familiares cada año, en más de 170 lugares, incluidas filiales de Gilda's Club y las asociaciones hospitalarias, una línea de ayuda gratuita y MyLifeLine, una comunidad de apoyo virtual para personas que viven con cáncer.

CAREGIVER ACTION NETWORK | **www.helpforcancercaregivers.org**
La ayuda para cuidadores de personas con cáncer, a través de Caregiver Action Network (CAN), es una colaboración de organizaciones con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas que cuidan a pacientes con cáncer.

LIVING BEYOND BREAST CANCER | **www.lbbc.org**
Living Beyond Breast Cancer conecta a personas afectadas por el cáncer de mama, con información confiable y una comunidad de apoyo.

THE METASTATIC BREAST CANCER ALLIANCE | **www.mbcalliance.org**
Metastatic Breast Cancer Alliance está dedicada a mejorar las vidas y los resultados de quienes viven con mBC y sus familias, aumentando la concientización y la educación sobre la enfermedad, y promoviendo políticas y la coordinación estratégica de la financiación de la investigación, específicamente enfocada en metástasis, lo que tiene el

potencial de prolongar la vida, mejorar la calidad de vida y, en última instancia, ofrecer una cura.

METASTATIC BREAST CANCER NETWORK | www.mbcn.org
Metastatic Breast Cancer Network (MBCN) es un grupo de apoyo dedicado a pacientes que viven con mBC, que ofrece educación e información sobre el tratamiento y sobre cómo sobrellevar la enfermedad.

METAVIVOR | www.metavivor.org
METAvivor está fervientemente comprometido con mujeres y hombres que viven con cáncer de mama metastásico, al aumentar la concientización de la enfermedad y financiar la investigación.

MYLIFELINE.ORG | www.mylifeline.org
MyLifeLine.org conecta a pacientes con cáncer de mama y cuidadores con su comunidad de familiares y amigos para que reciban apoyo social y emocional.

NATIONAL COALITION FOR CANCER SURVIVORSHIP | www.canceradvocacy.org
La Coalición Nacional para la Supervivencia del Cáncer (NCCS) es una organización de apoyo fundada por y para sobrevivientes del cáncer. La NCCS promueve el cambio de políticas, a fin de mejorar la atención del cáncer para los sobrevivientes y sus seres queridos.

SHARE | www.sharecancersupport.org
SHARE es una organización nacional sin fines de lucro que apoya, educa y empodera a las mujeres afectadas por cáncer de mama o cáncer de ovario, con especial atención a las comunidades marginadas desde el punto de vista médico. Su modelo de pares conecta a las mujeres, dondequiera que estén, con la perspectiva de mujeres que han pasado por lo mismo, creando una comunidad nacional donde nadie se siente solo. Sus servicios gratuitos incluyen grupos de apoyo, herramientas educativas, seminarios web y presentaciones conducidas por expertos, una línea de ayuda nacional, comunidades en línea, oportunidades de apoyo y exploración de pacientes-sobrevivientes.

SHARSHERET | www.sharsheret.org
Sharsheret es una organización nacional sin fines de lucro que brinda apoyo a mujeres jóvenes judías con cáncer de mama y a sus familias. Su misión es ofrecer una comunidad de apoyo para mujeres judías de cualquier procedencia, a quienes se les diagnosticó cáncer de mama o que tienen un mayor riesgo genético de padecerlo, al promover conexiones individualizadas culturalmente relevantes con redes de pares, profesionales de la salud y recursos relacionados.

TIGERLILY FOUNDATION | www.tigerlilyfoundation.org
Tigerlily Foundation es una fundación nacional del cáncer de mama que ofrece educación, concientización, defensoría y apoyo práctico a mujeres jóvenes, de entre 15 y 45 años, antes, durante y después del cáncer de mama.

YOUNG SURVIVAL COALITION | www.youngsurvival.org
Young Survival Coalition está dedicada a las cuestiones críticas que repercuten en las mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama, y ofrece recursos, conexiones y ayuda.

¿Cómo puedo recibir ayuda para pagar HALAVEN®?

Programa de $0 de Copago para HALAVEN*

El Programa de $0 de Copago para HALAVEN ayuda a los pacientes con seguro comercial elegibles con los gastos de bolsillo de HALAVEN (hasta $18,000 por año). Se aplican restricciones.†

*El Programa de $0 de Copago para HALAVEN asiste a los pacientes elegibles con los gastos de bolsillo de HALAVEN (hasta $18,000 por año).

†Se aplican restricciones. Visite **www.eisaireimbursement.com/patient/halaven** para ver los términos y condiciones y los requisitos de elegibilidad completos, para obtener más información sobre el programa y para descargar un formulario de inscripción. Los pacientes con seguro comercial elegibles podrían pagar $0 por mes, con un límite anual de $18,000. Consulte **www.eisaireimbursement.com/patient/halaven** para conocer los requisitos de elegibilidad y los términos y condiciones completos.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

THE EISAI ASSISTANCE PROGRAM

El Programa de Asistencia de Eisai

Eisai, el fabricante de HALAVEN, considera que el costo no debe ser un obstáculo para recibir tratamiento. Por eso, estamos comprometidos a ayudarle a identificar el apoyo financiero que puede estar disponible para usted. Ofrecemos el Programa de Asistencia de Eisai (Eisai Assistance Program, EAP). El EAP puede proporcionar información a pacientes y proveedores de atención médica sobre la cobertura para HALAVEN, así como información sobre programas que pueden ayudar a los pacientes elegibles a pagar su medicamento, aunque Eisai no puede garantizar la cobertura.

El EAP puede ayudarle a

- Comprender cómo su terapia podría estar cubierta por su seguro.
- Comprender el costo de bolsillo, que es la parte que usted paga y puede incluir copagos, coseguro o deducibles.
- Identificar posibles fuentes de cobertura si usted no tiene seguro, incluida la evaluación de la elegibilidad para participar en el Programa de Asistencia al paciente de Eisai (PAP).

Para obtener más información sobre el Programa de $0 de Copago para HALAVEN

llame al **1.855.EISAI.4U** (1.855.347.2448)
de lunes a viernes, de 8 A. M. a 5 P. M., hora del este

Para obtener más información sobre el Programa de asistencia de Eisai (EAP)

llame al **1.866.61.EISAI** (1.866.613.4724)
de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M., hora del este

Visite **www.eisaireimbursement.com/patient/halaven**

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Preguntas frecuentes

Qué es HALAVEN®?

HALAVEN es una quimioterapia aprobada por la FDA que ofrece a las mujeres con mBC progresivo una oportunidad para vivir más tiempo después de haber presentado progresión de la enfermedad con al menos 2 tipos de quimioterapias para el mBC.

¿Para quién es HALAVEN?

HALAVEN es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que ya han recibido otros tipos de medicamentos contra el cáncer después de que el cáncer se ha diseminado.

¿Qué tan eficaz es HALAVEN?

HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a algunas mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 quimioterapias previas para tratar el mBC en un estudio que incluyó a mujeres con todos los tipos de receptores tumorales.

En un estudio clínico de más de 750 mujeres, HALAVEN se comparó con otras quimioterapias o terapias hormonales que se utilizan comúnmente para tratar el mBC. Si bien algunas mujeres vivieron más tiempo y otras no vivieron tanto tiempo, las mujeres que fueron tratadas con HALAVEN vivieron, en promedio, un 25 % más que aquellas que recibieron otra quimioterapia o tratamiento hormonal (13.2 meses frente a 10.6 meses, respectivamente).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HALAVEN?

HALAVEN puede causar cambios en sus latidos cardíacos (lo que se denomina prolongación del intervalo QT).
Esto puede provocar latidos cardíacos irregulares. Su proveedor de atención puede hacerle un monitoreo cardíaco (electrocardiograma o ECG) o análisis de sangre durante su tratamiento con HALAVEN para detectar problemas cardíacos.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de HALAVEN?

- recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia)
- recuento bajo de glóbulos rojos (anemia)
- debilidad/cansancio
- caída del cabello (alopecia)
- náuseas
- estreñimiento

Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes del tratamiento y durante el tratamiento mientras esté recibiendo HALAVEN.

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

¿Cuál es el cronograma de tratamiento para HALAVEN?

Cada dosis de HALAVEN se administra mediante inyección durante un período breve de 2 a 5 minutos en forma de infusión. HALAVEN se administra una vez por semana durante 2 semanas, seguido de 1 semana de descanso. Esto se considera 1 ciclo de tratamiento.

Su proveedor de atención médica puede retrasar o disminuir su dosis o interrumpir el tratamiento. Consulte a su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en su cronograma de administración de dosis.

¿Durante cuánto tiempo recibiré tratamiento con HALAVEN?

Su proveedor de atención médica decidirá cuántos ciclos de tratamiento con HALAVEN recibirá.

¿Cubrirá mi seguro el tratamiento con HALAVEN?

En general, las compañías de seguro, Medicare y Medicaid, cubren HALAVEN. La cobertura puede variar según el tipo específico de seguro que usted tenga y según su proveedor de atención médica.

El Programa de Asistencia de Eisai (EAP) puede ayudarle a obtener más información sobre su cobertura, copagos, deducibles y otra información del seguro, o ayudarle a identificar posibles fuentes de cobertura si no tiene seguro, incluida la evaluación de la elegibilidad para el Programa de Asistencia al Paciente (PAP) de Eisai. Eisai no puede garantizar la cobertura de ningún reclamo.

Qué es el programa de $0 de Copago

El Programa de $0 de Copago para HALAVEN ayuda a los pacientes con seguro comercial elegibles con los gastos de bolsillo de HALAVEN.

Para obtener más información sobre el Programa de $0 de Copago para HALAVEN

- Llame al **1.855.EISAI.4U (1.855.347.2448)** de lunes a viernes, de 8 A. M. a 5 P. M., hora del este.
- Visite **www.eisaireimbursement.com/patient/halaven**

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL

Obtenga más información en www.halaven.com y consulte la comunidad @HALAVEN® en Facebook y YouTube

- Consejos para vivir con mBC
- Recetas nutritivas
- Otras novedades y recursos útiles

YouTube

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

HALAVEN® es una marca comercial registrada utilizada por Eisai Inc. con licencia de Eisai R&D Management Co., Ltd.
© 2021 Eisai Inc. Julio de 2021 HALA-US3522

Halaven® (eribulin mesylate) Injection | 0.5 mg/mL